


Consommation chair ferme



Disponible en Agriculture Biologique



- Haute résistance au mildiou du feuillage
- Très longue conservation
- Belle présentation et bonne qualité gustative

Caractéristiques générales

Maturité	Demi-précoce
Couleur de peau / chair	Jaune / Jaune
Tubercule	Allongé
Taille de plante	Moyenne
Port de plante	Semi-dressé

Qualités culinaires

Groupe culinaire	A	
Tenue à la cuisson	Très bonne	●●●●●
Noircissement ap. cuisson	Nul	●●●●●
Coloration à la friture	Foncée	●●○○○

Agronomie

Matière sèche	19 à 20 %	
Tubérisation	15 à 18	
Proportion de gros tub.	Moyenne	
Dommages à la récolte	Moy. sensible	●●●○○
Dormance	Longue	●●●●○
Conservation	Longue	●●●●●
Egermage	Moy. sensible	●●●○○
Défauts internes	Peu sensible	●●●●●
Lavabilité	Très bonne	●●●●●

Résistances parasites & maladies

Mildiou du feuillage	Résistante	●●●●●
Mildiou du tubercule	Moy. sensible	●●●○○
Nématodes Ro 1-4	Assez sensible	●●○○○
Nématodes Pa 2-3	Assez sensible	●●○○○
Gale commune	Peu sensible	●●●●●
Dartrose	Peu sensible	●●●●○
Virus Y	Moy. sensible	●●●○○
Virus Yntn	Peu sensible	●●●●●
Virus enroulement	Peu sensible	●●●●○
Alternaria	Peu sensible	●●●●○